




Вибір хірурга при периферичній оклюзійній хворобі, що поєднана із мультифокальним атеросклерозом:

- Знижує вираженість болювого синдрому і покращує гемодинамічні показники в ішемізованій кінцівці:¹
 - збільшує дистанцію безболової ходи і абсолютну дистанцію ходи;
 - покращує коефіцієнт якості життя пацієнтів.
- Кардіопротективна дія:
 - підвищує толерантність до фізичного навантаження у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги.²
- Нейропротективна дія:
 - збільшує середню швидкість мозкового кровотоку.³



1. Restoring Vascular Nitric Oxide Formation by L-Arginine Improves the Symptoms of Intermittent Claudication in Patients With Peripheral Arterial Occlusive Disease Rainer H. Boger, MD, et al Hanover, Germany JACC Vol. 32, No. 5 November 1, 1998:1336–44
2. Слободський В.А. Досвід застосування препарату Тівортін аспартат при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження//Український медичний часопис.-2009.-5.
3. Zimmermann C., Wimmer M., Haberl R.L. (2004) L-arginine-mediated vasoreactivity in patients with a risk of stroke. Cerebrovasc. Dis., 17(2–3): 128–133.

Форма випуску:

4,2% р-н L-аргініну гідрохлориду 100 мл для інфузій
L-аргініну аспартат (1г/5мл), розчин для пиття у флаконах
по 100 та 200 мл

Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/8954/01/01 від 18.09.2008 р. № UA/9941/01/01 від 18.08.2009 р.



Патогенетичне та клінічне обґрунтування використання аргініну гідрохлориду у хворих на ішемію нижніх кінцівок і мультифокальний атеросклероз

Мультифокальний атеросклероз – системне захворювання, яке потребує системних підходів до лікування, тому в останні роки значну увагу приділяють пошуку нових підходів до етіопатогенетичної терапії цього універсального патологічного процесу. Сьогодні реальна ситуація з консервативним лікуванням пацієнтів з ішемією нижніх кінцівок і мультифокальним атеросклерозом, на жаль, далеко не найкраща. З іншого боку, це стимулює учених і клініцистів до активного вивчення нових підходів до лікування захворювання й оцінки ефективності лікарських засобів, які ще повною мірою розкрили свій терапевтичний потенціал.

Аргінін (α -аміно- δ -гуанідиновалеріанова кислота) – амінокислота, яка є активним і різностороннім клітинним регулятором численних життєво важливих функцій організму, виявляючи при цьому важливі протекторні ефекти в критичних станах організму, у тому числі й ішемічного характеру.

L-аргінін, як субстрат для NO-сінтази, каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах. Препарат активує гуанілаткіназу і підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату (ЦГМФ) в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи утворенню й розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1, який є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації та міграції лейкоміоцитів судинної стінки. L-аргінін також пригнічує синтез асиметричного диметиларгініну (АДМА) – потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу.

Таким чином, застосування L-аргініну сьогодні розглядають як один із перспективних напрямів етіопатогенетичної терапії пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом.

Мета дослідження – оцінка терапевтичної еквівалентності за показниками ефективності препаратору Тівортін® у пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок з тяжким перебігом і трофічними змінами.

Матеріали й методи

Об'єкт дослідження – 72 пацієнти (36 – основна і 36 – контрольна групи) обох статей віком від 30 до 70 років з діагнозом «oblітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок і таза III–IV ст.», які мали трофічні виразки гомілок і стоп. Пацієнти піддавалися на стаціонарному лікуванні у відділеннях хірургії і судинної хірургії, що є клінічними базами кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Пацієнти основної групи одержували досліджуваний препарат Тівортін®, розчин для інфузій 4,2% у флаконах по 100 мл внутрішньовенно упродовж 14 днів, пацієнти контрольної групи – алпростадил в ампулах для внутрішньовенних ін'єкцій по 20 мг. Етапи дослідження: 0-й день (напередодні початку терапії), 14-й (кінець стаціонарного етапу і введення препаратору), 30-й, 60-й і 90-й (табл. 1).

Під час об'єктивного огляду враховували:

- характер пульсації на симетричних ділянках нижніх кінцівок (виразна, послаблена, відсутність пульсації);

- дані вимірювання кісточково-плечового індексу – відношення А/Т у ділянці гомілковостопного суглоба до А/Т у плечової артерії (у нормі відношення становить 1,0 або трохи вище. Хворі зі скаргами на переміжну кульгавість зазвичай мають кісточково-плечовий індекс, нижчий за 0,8. У пацієнтів з болем у стані спокою кісточково-плечовий індекс нижчий за 0,5 – це критична ішемія і додатковий критерій включення);

– біль у стані спокою, розміри трофічної виразки, ступінь набряку кінцівки, дистанція ходьби до появи ознак переміжної кульгавості.

Під час дослідження використовували спеціально розроблену шкалу інтенсивності болю, на якій пацієнт суб'єктивно відзначав ступінь вираженості бальового синдрому. Шкала мала вигляд градуйованої прямої лінійки завдовжки 100 мм (рис. 1).

Ультразвукову допплерографію виконували на ультразвуковому апараті за допомогою датчиків 4 та 8 МГц. Реєстрували швидкість і напрямок кровообігу по артеріях нижніх кінцівок. Ультразвукову допплерографію артерій нижніх кінцівок проводили з визначенням кісточково-плечового індексу по задній великогомілковій артерії і артерії тілу стопи. З метою вимірювання регіонарного систолічного тиску (РСТ) використовували пневматичну манжету, яку накладали навколо кінцівки. Тиск у манжеті, за якого відновлювався кровообіг у дистальній ділянці кінцівки під час декомпресії, є систолічним тиском на рівні накладання манжети. Обов'язковими умовами дослідження були: максимально близька відстань між пневматичною манжетою і місцем локації артерії, реєстрація першого систолічного комплексу під час декомпресії манжети; швидкість декомпресії манжети дорівнювала 0,3 кПа (2 мм рт. ст.) на один систолічний комплекс. РСТ визначали у положенні хворого лежачи при температурі комфорту (18-21°C). Оскільки показник РСТ залежить від системного артеріального тиску, індекс РСТ розраховували як відношення РСТ на гомілкових артеріях до тиску на плечовій артерії:

індекс РСТ = РСТ великогомілкових артерій/АТ плечової артерії

За об'єктивну величину артеріального перфузійного тиску брали максимальний систолічний тиск.

Не менш важливим показником, що характеризує регіонарну гемодинаміку, є пульсовий об'єм кровообігу, який ми вивчили у хворих обох груп. У хворих з IV стадією ішемії цей показник становив $1,9 \pm 0,1$ мл/с.

Мікроциркуляцію у тканинах нижніх кінцівок досліджували за допомогою лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ). Мікроциркуляцію в тканинах у хворих з оклузією артерій досліджували в ділянці великого пальця стопи. Вимірювання проводили після 15-хвилинної адаптації хворого. Визначали величину перфузії, тобто сумарний капілярний кровообіг, виражений у перфузійних одиницях (ПО). Величина перфузії в нормі становить $67,4 \pm 11,3$ ПО.

Об'єм нижніх кінцівок визначали так. За допомогою звичайної сантиметрової стрічки вимірювали окружності верхньої та нижньої третин стегна, висоту стегна, окружність верхньої, середньої нижньої третин гомілки, висоту від верхньої третини гомілки до середньої третини гомілки, висоту від середньої третини гомілки до нижньої



В.Г. Мішалов

третини. Отримані результати вимірювань розраховували за формулою:

$$V_k = 0,027 [h_1(l_2 + l_1 \times l_2 + l_2^2) + h_2(l_2^2 + l_3 \times l_4 + l_4^2) + h_3(l_4^2 + l_4 \times l_5 + l_5^2)], \text{де}$$

V_k – об'єм кінцівки;
 l_1 – окружність верхньої третини стегна;
 l_2 – окружність нижньої третини стегна;
 l_3 – окружність верхньої третини гомілки;
 l_4 – окружність середньої третини гомілки;
 l_5 – окружність нижньої третини гомілки;
 h_1 – висота стегна;
 h_2 – висота від верхньої третини гомілки до середньої третини гомілки;
 h_3 – висота від середньої третини гомілки до нижньої третини гомілки.

Враховуючи той факт, що об'єм нижньої кінцівки фізіологічно відрізняється у пацієнтів з різними ростом і масою тіла, розраховували його різницю між ураженою і здоровою кінцівками.

Субфасціальний тиск вимірювали за допомогою апарату Вальдмана у задньомедіальному м'язовому футлярі за методом Т.Е. Whitesides у модифікації В.І. Гайовича (1992) в горизонтальному положенні хворого (рис. 2). Сутність методу полягалла в використанні конструкції, що складається з триходового крана, ін'єкційної голки діаметром не менше 1 мм, системи трубок апарату Вальдмана і шприца 20 мл. Ін'єкційну голку й частину трубок апарату Вальдмана заповнювали стерильним фізіологічним розчином. Перед введенням голки у субфасціальний простір (де розташований гомілковий м'яз) виконували інфільтраційну анестезію шкіри 0,5% розчином новокайну. Введення анестетика під фасцію вважали недопустимим, оскільки це може привести до спотворення результатів вимірювання. Голку,




Рис. 1. Шкала інтенсивності болю, яку було використано в дослідженні

Таблиця 1. Дизайн дослідження	
Назва	Відкрите багатоцентрове тримісячне порівняльне подвійне дослідження ефективності Тівортіну у хворих на біль у нижніх кінцівках атеросклеротичного генезу у стані спокою
Завдання	Первинним завданням була оцінка можливості використання Тівортіну у хворих III-А, III-Б і IV ст. ішемії нижніх кінцівок. Вторинним завданням була оцінка здатності препарату зменшувати ступінь вираження бальового синдрому у стані спокою, зменшувати площину трофічних змін, величину ішемічного набряку, покращувати гемодинамічні показники в ішемізованих нижніх кінцівках
Пацієнти	У дослідження включили пацієнтів з клінічною картиною болю у стані спокою, ішемічного набряку і трофічних змін (III-IV ст. ішемії нижніх кінцівок за класифікацією Європейської асоціації ангіологів і судинних хірургів)
Тип дослідження	Відкрите тримісячне порівняльне подвійне
Тривалість дослідження	3 місяці
Етапи дослідження	1. День 0-й (напередодні початку терапії) 2. День 14-й (кінець стаціонарного етапу) 3. День 30-й 4. День 60-й 5. День 90-й
Оцінка ефективності	Покращення показників гемодинаміки Зменшення площини трофічних змін Зменшення інтенсивності болю у стані спокою Зменшення об'єму ураженої кінцівки
Оцінка безпеки	Наявність побічних реакцій



Рис. 2. Вимірювання субфасціального тиску у задньомедіальному м'язовому футлярі за допомогою апарату Вальдмана

Продовження на стор. .

В.Г. Мішалов, д.м.н., професор, В.А. Черняк, О.І. Сопко, кафедра хірургії № 4, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Патогенетичне та клінічне обґрунтування використання аргініну гідрохлориду у хворих на ішемію нижніх кінцівок і мультифокальний атеросклероз

Продовження. Початок на стор. .

заповнену фізіологічним розчином, вводили під фасцію й ізолювали її за допомогою триходового крану від системи «апарат Вальдмана-шприц». Використовуючи шприц, підвищували тиск у системі до 20 мм рт. ст., а за допомогою триходового крану переводили систему в режим «апарат Вальдмана-ін'єкційна голка». Коли рівень фізіологічного розчину починав наближатися до голки, вимірювання закінчували. У випадках, коли зміщення рівня не відбувалося, продовжували вимірювання, поетапно підвищуючи тиск у системі «апарат Вальдмана-шприц» на 10 мм рт. ст. Прохід-

ність голки перевіряли шляхом активного скорочення гомілкового м'яза хворими, що супроводжувалося підвищеннем субфасціального тиску.

Оцінка ефективності

— Збільшення перфузії тканини ураженої кінцівки за даними ЛДФ після закінчення 14-денного курсу лікування.

— Послаблення болевого синдрому у стані спокою, зменшення площини трофічної виразки та величини набряку кінцівки, дистанція ходьби, яку подолав обстежений пацієнт до появи ознак переміжної кульгавості після закінчення 14-денного курсу лікування.

Стадія ішемії	День 0-й		День 14-й		День 30-й		День 60-й		День 90-й	
	Група Тівортіну	Група контролю								
III-А ст.	70±1,8	67±1,7	68±1,7	69±1,7	60±1,6	67±1,8	52±1,4	88±1,6	30±1,4*	87±1,8
III-Б ст.	78±1,7	76±1,7	67±1,7	76±1,6	62±1,3	79±1,7	49±1,5	78±1,2	48±1,3*	86±1,6
IV ст.	62±1,4	61±1,4	60±1,4	69±1,3	57±1,2	72±1,5	44±1,4	81±1,6	32±1,4*	73±1,5

* $p<0,05$ відносно 0-го дня у групі Тівортіну і 90-го дня у групі контролю.

Результати

Аналізуючи динаміку кількісних критеріїв ефективності лікування, наведених у таблиці 2, були зроблені такі висновки:

— кісточково-плечовий індекс збільшується в кожній групі від візиту до візиту (за винятком 2-го візиту);

— САТ і ДАТ деякою мірою зменшуються тільки в контрольній групі;

— ЧСС майже не змінюється в обох групах;

— температура шкіри ураженої поверхні, дистанція ходьби, величина перфузії збільшуються в обох групах, але достовірно більше — у хворих основної групи.

Ефективність проведеного лікування оцінювали також за динамікою клінічної картини, у першу чергу інтенсивністю більового синдрому. Дані, наведені у таблиці 3, свідчать про істотне зменшення більового синдрому у пацієнтів групи Тівортін®: на 57,1% у пацієнтів із III-А стадією хвороби, на 38,5% у пацієнтів із III-Б стадією і на 48,4% у пацієнтів з IV стадією. У той самий час серед пацієнтів групи контролю спостерігалося прогресивне збільшення величини більового синдрому: на 33,0% у пацієнтів із III-А стадією, на 21,7% у пацієнтів із III-Б стадією і на 16,4% у пацієнтів з IV стадією.

Динаміка трофічних змін була такою: серед пацієнтів групи Тівортін® нові трофічні розлади не зафіксовано. Збільшення площини ураження трофічної виразки й некрозу виявили у двох пацієнтів у середньому на $1,1 (\pm 0,2) \text{ см}^2$ на 14-й і 60-й дні дослідження.

Серед пацієнтів групи контролю у трох виявили нові трофічні розлади у вигляді трофічних виразок і некрозів. Збільшення площини ураження трофічної виразки й некрозу спостерігалося у шістьох пацієнтів у середньому на $2,9 (\pm 0,3) \text{ см}^2$, починаючи з 14-го дня дослідження. Слід зазначити, що двом пацієнтам з групи контролю, у яких виявили трофічні зміни, знадобилося виконання малих ампутацій наприкінці дослідження у зв'язку з поглиблением зон ураження.

Динаміка ішемічного набряку також свідчила про більшу ефективність лікування серед пацієнтів групи Тівортін®, де зафіксували зменшення різниці об'ємів між ураженими й контралатеральними кінцівками на $9,4 \pm 0,2 \text{ см}^2$. У пацієнтів групи контролю зафіксовано зменшення на $2,6 \pm 0,1 \text{ см}^2$, що у 3,6 раза менше, ніж відповідний показник серед пацієнтів групи Тівортін®.

Коефіцієнт якості життя, оцінений в аналоговому масштабі, збільшився з $3,51 \pm 0,18$ до $8,3 \pm 0,4$ у групі Тівортін®, до $7,0 \pm 0,5$ у групі контролю ($p<0,05$). Також у пацієнтів основної групи зафіксовано покращення показників регіонарної гемодинаміки.

Висновки

1. Тівортін® клінічно і статистично значимо покращував показники мікроциркуляції у тканинах нижніх кінцівок, сегментарного тиску в судинах нижніх кінцівок, дистанції ходьби до появи ознак переміжної кульгавості, зменшував біль у стані спокою, площину трофічних виразок та ішемічний набряк.

2. Тівортін® не викликав серйозних побічних ефектів, добре переносився хворими.

3. Результати цього клінічного дослідження і порівняння з результатами застосування простагландину дають змогу рекомендувати препарат Тівортін® для медичного застосування з метою лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, у тому числі з наявністю трофічних змін шкіри гомілок і стоп.

Таблиця 2. Аналіз кількісних критеріїв ефективності за допомогою методів описової статистики (основна група і контрольна група)

Показник	Візит	Статистичні показники											
		Основна група (Тівортін®)					Контрольна група						
		N	Середнє арифметичне	Медіана	Стандартне відхилення	Мінімум	Максимум	N	Середнє арифметичне	Медіана	Стандартне відхилення		
Кісточково-плечовий індекс	1-й	36	0,40	0,4	0,11	0,35	0,46	36	0,42	0,63	0,09	0,34	0,45
	2-й	36	0,40	0,405	0,11	0,45	0,46	36	0,462	0,63	0,09	0,34	0,45
	3-й	36	0,50	0,5	0,11	0,49	0,52	36	0,50	0,715	0,09	0,4	0,43
	4-й	36	0,66	0,66	0,11	0,56	0,71	36	0,56	0,875	0,10	0,44	0,48
	1-й – 2-й	36	0,00	0	0,01	-0,04	0,02	36	0,00	0	0,01	-0,01	0,03
	1-й – 3-й	36	-0,10	-0,09	0,03	-0,19	-0,04	36	-0,08	-0,08	0,02	-0,14	-0,04
	1-й – 4-й	36	-0,26	-0,255	0,06	-0,39	-0,15	36	-0,24	-0,23	0,05	-0,35	-0,16
ЧСС	1-й	36	85,78	87	6,07	76	84	36	78,64	78,5	5,14	69	90
	2-й	36	86,00	86,5	6,23	74	86	36	78,58	78,5	5,08	69	90
	3-й	36	82,08	82	6,26	70	93	36	79,19	79,5	5,39	67	90
	4-й	36	82,08	82	6,26	70	93	36	78,92	79	4,91	69	90
	2-й – 1-й	36	-0,22	0	1,10	-2	2	36	0,06	0	0,47	-1	1
САТ	3-й – 1-й	36	3,69	4	2,34	0	7	36	-0,56	0	3,81	-10	8
	4-й – 1-й	36	3,69	4	2,34	0	7	36	-0,28	0	1,91	-5	4
	1-й	36	145,06	145	2,28	133	146	36	146,08	149	7,01	133	156
	2-й	36	145,03	145	3,54	133	145	36	146,33	149,5	6,84	131	155
	3-й	36	144,25	143	2,21	134	150	36	145,08	147	7,14	130	155
	4-й	36	140,56	140	3,00	125	143	36	141,69	143,5	6,63	124	152
	1-й – 2-й	36	0,03	0	1,28	-2	2	36	-0,25	0	1,25	-2	2
ДАТ	1-й – 3-й	36	0,81	1	1,04	-1</							